

世之妊娠婦女。每以不能預知胎兒之屬男屬女爲遺憾。考世俗預測之法。均以孕婦腰腹部之形態爲標準。大概以上小下大。如箕之形者。屬女。而以中正圓高。如釜之形者。屬男。然證諸事實。往往不確。余自入助產學校後。對於鑑定胎兒之男女。必欲得一確切不移之方法而後快。乃以平日學校師長之指導。與時院臨症之經驗。互相證明。得鑑定法數則。披露如下。是否有當。尙希高明指教爲幸。

凡屬預定之分婉期。而遲遲不分婉者。及夫較妻強壯者。則知其胎兒爲比較的大者。分娩時甚需力者。多屬男子。反是者。則多屬女子。

然此不過指平產而言。若遇難產之婦。或初產而產門狹小者。以及胎兒肥大者。均不能因其分娩時之甚需力。而即斷其屬男胎也。

此外更有一法。即先將夫婦之年齡相加。更注意其妊娠之經過。是否爲跨於兩年者。若跨及兩年。則於年齡之總數加二。不然則加一。其得數。如係偶數。則爲女子。奇數則爲男子。此法余聞諸同學言。未知確否。因未經實驗。不敢據言其有教也。

茲更述一事以告讀者。即去年在醫院中。有一產婦。勢將臨產。同學中有欲余鑑定此胎之男女。以證余診斷之確否。余先以聽筒聽胎兒之聲。後再施行其他之診察。均屬男而非女。乃曰男胎也。及產果然。足見天下事苟能潛心研究。自能有明瞭之日。豈獨產科也哉。



(姚伯麟)

人力而造母乳者。取牛羊山羊乳。下等動物之乳。以此與母乳。爲相等之調和術。使其爲最適於嬰兒之食品。牛乳最多使用。故今比較母乳與牛乳之含有成分量。而移於哺乳之方法。

母乳之成分量（據霍爾托氏分析）

脂肪質 四〇〇

牛乳之成分量(同上)				
水分	蛋白質	鹽類	脂肪質	糖分
八七・〇〇	〇・七〇	四・〇〇	三・〇五	四・三〇
八七・〇〇	一・五〇	〇・二〇	八七・三〇	七・五〇

單方錄  
(黃勝白)

又名急解索（勝按急解索者言蛇繞人如索此藥能急解之也）  
主蛇咬傷。搗汁飲。以洋園漆之云云。惜余少野居之暇。不得勤採訪之也。

威云。此草亦 *Lobelia* 之一種。威云即 *Lobelia* 但未見鮮相核。不敢遽加判斷。但觀本草。論其又治寒胸氣喘。其功能或近似乎。當富求得兩種生藥標本一詳辨之。

子淋治法  
(濟平)

孕婦小洩，知赤痢難。酌蓮、白  
痛癢。甚至帶下血液。病名清  
淋。多屬熱結膀胱。法當清利  
。可用當歸一錢。赤芍黑山梔  
各二錢。赤茯苓錢半。子苓一  
分。甘草稍五分。水煎服。

**口休糧方**  
(薄谿漁人)

遶渭咸同間。秀水多隱者。先生炳元。乃其一也。雅喜黃老術。結茅於西湖紫陽山麓。

途健婦指痛疾婦解  
徑康女導苦病女決

本	書	內	全	有	并	注
簡明辨端法	心理治療法	實證退熱法	根本突擊法	肝氣自療法	血動急救法	久帶無效法
求孕得胎法	辨別胎孕法	產產預知法	產產避免法	通乳神效法	產產備生法	產後枝於法
痛經自療法	痛經自療法	經水輝色法	乾血癆治法	經閉通經法	立下胞衣法	產門退腫法
倒產急救法	坐骨痛治法	骨包生治法	產產急救法	產產急救法	問斷生治法	陰癰治療法
上經	三層	一袋	厚紙	收	大洋	發行

百病指南  
(十六)  
(張治河)

與太白鄉公直地契。每當春秋佳日。二公常徜徉於岩雪之間。泛輕舟。陟高峯。優游歲月。樂此不疲。民恒孟春。記者晤陸公於芝澤東北區之定心庵。古稱之年者四十許人也。叩其平日起居如故。所異者天祐。即起告。數年如一日。夫采奕奕。目光炯炯。細問其故。只說止靜養氣。并授余道錄。直冒一稿。廖廖數百字。讀過紅欄翠舫。誠非封建時代之福學也。尤奇者陸重山嶺嶺間。惟數月不食。而未覺飢渴者。以專誦此三者。今貢本刊。以專誦者。藉作紀念云。

**止渴丹**  
 雨前茶一斤。烏梅肉淨半斤。生甘草半斤。其研細末。用白蜜四兩。和開水搗成團。每九重五分兩乾。含之可以止渴。如出外遠行。遇窮鄉僻處。帶之大爲合宜。  
未完

地黃之研究  
(葉橘泉)

品者  
和漢藥考曰。地黃之服品有三種。卽生地黃（鮮地黃）乾地黃熟地黃。生地黃爲未晒乾有汁之生根。熟地黃爲蒸乾者。乾地黃係冬季採掘晒乾者。三種新鮮時內部都爲黃色。經久則變黑色。又極細沙於桶。將活地黃根貯藏其中。保全其生意者。日本謂之砂活。

將地黃生根置入水中。浮者謂之天黃。半浮半沉者謂之人黃。全沉者謂之地黃。天黃不適藥用云。

東洞藥徵曰。諸家本草皆謂乾地黃爲熟地黃。而藥師以乾地黃爲生地黃。非也。乾者燥乾之謂。

## □ 痿易治療法

定義 四支不舉。左右變易爲痿也。

原因 寒濕內傷膀胱。飲食滯滯脾臟。

病理 膀胱外屬皮膚。又爲貯尿之器。膀胱有病。則皮膚排泄失常。貯尿能量障礙。尿毒由經脈外溢於皮膚。卽爲黃疸。內入於脾。脾主四肢。四肢之筋脈。受尿毒所害。則爲痿易。痿易者。萎棄而不能如常之動作也。素問陰陽別論曰。「三陽三陰發病。偏枯痿易。四支不舉。」張隱庵註云。「三陽三陰者。太陽太陰之爲病也。偏枯者。半身不遂。痿易者。萎棄而不能如常之動作。太陽爲諸陽主氣。陽氣虛而不能養筋。則爲痿。脾屬四支。故不舉。」三陽膀胱之脈。自頭背下行於足。三陰脾之脈。通於四支。二經之筋脈有積毒。毒熏筋敗。故四支不舉。左右變易爲痿也。

(未完)

【病理】

爲外國刺激。故其現象。與感冒相同。  
咳嗽痰多。氣管發炎。分泌亢進故也。  
綿綿不愈。感冒風寒。氣管業已發炎。復  
因不慎飲食起居。  
(未完)

品考

植物形態

屬玄參科地黃之根。爲多生草。多栽植於圃間。莖高六七寸。葉厚而互生。作長橢圓形。邊緣有鋸齒。面有綫紋毛茸。花作繖狀。花序排列。有黃白帶紫色。盾形花萼。

地黃有赤夫夫二種。甲根細長皮薄肉厚。皮部綫紋緻密。乙根肥大皮厚。綫紋不緻密。有疣瘡。爲下品。

生地黃(鮮地黃)甘大寒。乾地黃(生地黃)甘寒。熟地黃甘微苦微溫。

性味

。仲景氏之所用。生乾二品而已。其熟云者。後世之爲也。不可用矣。